

Lo más destacado en breve



¿Para qué sirven las pastillas de yodo?

Las pastillas de yoduro de potasio 65 SERB son pastillas que contienen una alta dosis de yodo y que deben utilizarse en caso de emergencia cuando las autoridades así lo ordenen. En caso de accidente grave en una central nuclear puede producirse un escape, entre otros, de yodo radioactivo. Las personas lo absorben al respirar y se acumula en la glándula tiroides. Las pastillas de yodo evitan que la tiroides absorba yodo radioactivo.

¿Cómo deben conservarse las pastillas de yodo?

Las pastillas de yodo deben conservarse a temperatura ambiente (15 – 25 °C) en su envase original cerrado. Mantenga los comprimidos fuera del alcance de los niños.

¿Cuándo ordenan las autoridades que se tengan a mano y se ingieran las pastillas de yodo?

Si durante un grave accidente en una central nuclear existe el riesgo de que se produzcan escapes de sustancias radioactivas, las autoridades alertan e informan a la población: mediante sirenas, radio u otros medios de comunicación. Las pastillas de yodo se deben ingerir una vez con abundante líquido cuando así lo determinen las autoridades. Igualmente, las autoridades comunican si es necesario repetir la ingesta de las tabletas.

¿Por qué se distribuyen pastillas de yodo como medida de prevención?

Usted vive en un radio de 50 km de una central nuclear. A fin de que pueda usted ingerir las pastillas a tiempo en caso necesario, las autoridades se las envían a su domicilio de forma automática y gratuita como medida de prevención. El envío incluye a propósito un mayor número de pastillas de las que serían necesarias para una persona. Así puede usted repartir pastillas entre aquellos familiares o visitas que no han recibido las pastillas o no las llevan consigo.

¿Quién debe ingerir las pastillas de yodo?

Las pastillas de yodo constituyen una medida eficaz para prevenir el cáncer de tiroides en niños, jóvenes, embarazadas y personas de menos de 45 años. La ingesta de las pastillas de yodo no se recomienda a personas mayores de 45 años. Si es usted mayor de 45 años y está considerando ingerir pastillas de yodo en caso de emergencia, acuda a su consulta médica, farmacia o droguería para recibir más información.

¿Cómo debe utilizar las pastillas de yodo?

Consulte el prospecto.

Más información:

www.comprimesiode.ch

